

# Sofortmaßnahmen nach HIV Exposition

## Sofort:

- Fremdmaterial entfernen
- Blutung anregen bei sichtbarer Verletzung
  - ⇒ Dauer 1-2 Minuten
- Hilfsperson zuziehen
- Desinfektion mit alkoholischen Desinfektionsmitteln,
  - ⇒ Dauer 2-4 Minuten

 **Effektive Desinfektion schmerzt !!!**

## Bei Schleimhautkontakt:

- mehrere Minuten spülen
- notfalls mit Wasser
- ansonsten Octenisept oder PVP-Jod (falls sofort verfügbar)

## Danach:

- Abschätzen der Infektionsgefahr:
  - Material?
  - Menge?
  - Verletzungsart?
- Patientenanamnese?
  - Angaben wichtiger Informationen:
    - ✓ bekannter Patient?
    - ✓ befindet er sich schon in einer antiretroviralen Therapie?

**⇒ HIV Ambulanz kontaktieren: Tel. ....  
(Mo – Fr 8.00 – 15.30 Uhr ???)  
außerhalb der o.a. Dienstzeiten: Tel. ....**

- Beratung über weiteres Vorgehen
- Unfallchir. Ambulanz (D-Arzt-Verfahren)
- Personalarzt